



Num. 75. Publicado el 15/05/2006

La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.

Fotografía: . Por César Fernández González



Num. 75. Publicado el 15/05/2006

Descripciones de especies

Trifolium pratense L.

Hierba perenne con tallos que miden entre 6 y 110 cm. Éstos son glabros, glabrescentes o con pelos adpresos o patentes, de hasta 1 mm de longitud. Las...

Vive en prados de siega, aunque también aparece en los de diente, cultivos abandonados y bordes de caminos, en suelos generalmente frescos, arcillosos...

Desde Noruega hasta España y el oeste de Asia....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/trifolium-pratense.html>

Scomberesox saurus subsp. saurus (Walbaum, 1792)

Pez de cuerpo alargado y comprimido que alcanza los 50 cm de longitud. Las mandíbulas, provistas de pequeños dientes, son también alargadas y la infer...

Es una especie oceánica gregaria que puede formar grandes bancos y que en ocasiones se acerca a la costa. Se alimenta de zooplancton y larvas de peces...

Desde Noruega, Islandia y Dinamarca hasta Marruecos y el Mediterráneo....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/scomberesox-saurus-subsp-saurus.html>

Rissoa guerinii Récluz, 1843

Molusco gasterópodo de concha ovalada a cónica, sólida, con 8 vueltas de espira que alcanza los 5 mm de altura y los 2 de anchura. Las últimas 4 o 5 v...

En aguas poco profundas, sobre algas o bajo piedras....

Desde las Islas Británicas a Canarias y el Mediterráneo....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/rissoa-guerinii.html>

Paralcyonium spinulosum (Delle Chiaje, 1822)

Coral alcionario, octocoralario formador de colonias gruesas y carnosas, de entre 3 y 10 cm de altura, con un esqueleto axial interno formado por



espí...

Vive en hendiduras de rocas en fondos fangosos o con detritos....

Común en el Mediterráneo. En las costas atlánticas aparece de forma aislada y muy rara hasta la Bretaña francesa....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/paralecyonium-spinulosum.html>

Pancratium maritimum L.

Planta perenne, provista de un bulbo bastante enterrado, de 5 - 7 x 4 - 5 cm con un cuello bastante largo y tónicas membranosas pálidas. El escapo fl...

Crece en las dunas costeras, desde el nivel del mar a los 50 m de altitud....

Aparece en las costa atlántica de Norteamérica, S de Europa -desde la desembocadura del Loira, en Francia, hasta las costas de Bulgaria-, N de África...

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/pancratium-maritimum.html>

Neptunea antiqua (Linnaeus, 1758)

Gasterópodo con concha de unos 100 x 50 mm, a veces más larga, con 7 vueltas de espira. La protoconcha es bulbosa y la última vuelta de espira ocupa u...

Sublitoral, encontrándose desde los 15 a los 1200 m, generalmente en sustratos blandos....

Desde el Cantábrico al ártico....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/neptunea-antiqua.html>

Luidia ciliaris (Philippi, 1837)

Es una estrella de gran tamaño, que alcanza los 40 - 75 cm de diámetro. El cuerpo y los brazos, de textura aterciopelada, son de color rojizo, pardo a...

En sustratos de arena, grava o mixtos hasta los 400 m de profundidad, en los que puede enterrarse parcialmente. Se alimenta de otros equinodermos, com...

Desde las Islas Feroes a Cabo Verde y el Mediterráneo....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/luidia-ciliaris.html>



Liza aurata (Risso, 1810)

Pez de cuerpo alargado y fusiforme, de hasta 50 cm de longitud, cilíndrico, con grandes escamas que cubren todo el cuerpo. La cabeza relativamente anc...

Se trata de una especie nerítica que entra en lagunas y estuarios. Se alimenta de pequeños organismos bentónicos y ocasionalmente insectos y plancton....

Desde Escocia a Cabo Verde, Mediterráneo y Mar Negro....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/liza-aurata.html>

Didemnum maculosum (Milne-Edwards, 1841)

Ascidia que forma colonias de textura lisa o rugosa, duras, de color variable, que puede ser blanco, grisáceo o blanquecino con parches violáceo; suel...

Crece sobre rocas u otros organismos, especialmente algas, como Laminaria, Cystoseira y Delesseria, en aguas poco profundas....

Desde el Mar del Norte y las Islas Británias al Mediterráneo....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/didemnum-maculosum.html>

Cynosurus cristatus L.

Planta perenne, con tallos de entre 15 y 80 cm de altura, de consistencia bastante fuerte. Las hojas miden 0.5 - 2 mm de ancho y tienen una vaina lisa...

Vive en prados de siega, setos y orlas de bosques, desde el nivel del mar a los 1700 m. ...

Presente en la mayor parte de Europa....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/cynosurus-cristatus.html>

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Codium bursa (Chlorophyta)

Cymbalaria muralis P. Gaertn., B. Mey. & Scherb. (Magnoliophyta)



Euphorbia amygdaloides L. (Magnoliophyta)

Fumaria capreolata L. (Magnoliophyta)

Hordeum murinum L. (Magnoliophyta)

Iberis procumbens (Magnoliophyta)

Limosa limosa (Linnaeus, 1758) (Chordata)

Ononis reclinata (Magnoliophyta)

Reseda media Lag. (Magnoliophyta)

Senecio pyrenaicus (Magnoliophyta)

Silene nutans L. (Magnoliophyta)

ISSN 1887-5068



9 771887 506008