



## Num. 753. Publicado el 02/09/2019

*La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.*

Fotografía: *Turdus torquatus*. Por Pilar Fatou



**Num. 753. Publicado el 02/09/2019**

## Descripciones de especies

### *Silene sedoides* Poir.

Planta anual, de 4-10(15) cm, densamente glanduloso-pubescente, con tallos ascendentes generalmente muy ramificados desde la base. Hojas espatulado-elí...

Roquedos calizos y arenales cercanos al mar....

Litoral de la región mediterránea. NE de la Península Ibérica y las Baleares; citada de Cartagena....

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/silene-sedoides.html>

### *Scrophularia canina subsp. ramosissima* (Loisel.) P. Fourn.

Planta sufruticosa, glabra, aunque a veces con glándulas sésiles en diferentes órganos. Tallos hasta de 45(58) cm, muy ramificados desde la base, con ...

Arenales litorales o del interior, terrenos removidos y fisuras de rocas calizas de las zonas más térmicas de las Baleares; 0-200 m....

Oeste de la región mediterránea. Baleares....

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/scrophularia-canina-subsp-ramosissima.html>

### *Malva parviflora* L.

Planta herbácea anual con tallo de 0,1-0,75 m, solitario y erecto, más raramente 2 o más y, en estos casos, postrado-ascendentes, pubescentes con pelo...

Ruderal, viaria, arvense y en suelos yesosos nitrificados; 0-900 m....

Zona mediterránea, SW y S de Asia y Macaronesia. Dispersa por gran parte de la Península Ibérica, pero rara hacia el NW....

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/malva-parviflora.html>

### *Fumana ericifolia* Wallr.

Planta sufruticosa de 25-30(40) cm, muy ramoso desde la base, con ramas que nacen todas de una cepa gruesa, ascendentes, delgadas, con indumento gland...

Matorrales y tomillares soleados y abiertos, en suelo pedregoso y fisuras de rocas calizas; 0-1700 m....

Oeste de la región mediterránea. Más o menos frecuente en la mayor parte de la Península Ibérica y las Baleares, excepto en las regiones con substrato...



Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/fumana-ericifolia.html>

## *Colchicum autumnale* L.

Planta perenne con un bulbo de 2,5-4 x (2)2,5-3,5(4) cm; túnicas coriáceas, de un pardo oscuro, rojizo o negruzco. Catafilo con el ápice libre de obt...

Pastos húmedos en zonas abiertas de siega o en claros de bosque, a veces en cunetas o bordes de arroyo; (450)700-1700(2000) m....

Europa, autóctona en el C y S, naturalizada en el N. NE de España: Pirineos centrales y orientales....

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/colchicum-autumnale.html>

## **Nuevas especies incluidas en asturnatura.com**

*Apium nodiflorum* (L.) Lag. (Magnoliophyta)

*Estrilda astrild* (Linnaeus, 1758) (Chordata)

*Monticola saxatilis* (Linnaeus, 1766) (Chordata)

