



## Num. 761. Publicado el 28/10/2019

*La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.*

Fotografía: *Buthus montanus*. Por José Rafael González López



**Num. 761. Publicado el 28/10/2019**

## Descripciones de especies

### *Senecio legionensis* Lange

Hierba perenne, erecta, con rizoma más o menos horizontal de 2-5,4 x 0,6-0,9 cm. Tallos de 0,5-1,1 m, estriados, sin ramas, con hojas persistentes, gl...

Praderas húmedas, borde de arroyos y orlas de bosque caducifolio; 400-1450 m. ...

NO de la Península Ibérica. Vertiente S de la Cordillera Cantábrica, macizo Galaico-Leonés y Serra da Peneda. ...

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/senecio-legionensis.html>

### *Paidiscura pallens* (Blackwall, 1834)

Araña pequeña, con un tamaño de 1,2 a 1,4 mm en los machos, y de 1,7 a 2mm en las hembras. Presenta variabilidad en la coloración y patrón, pero gener...

Vive en una amplia variedad de hábitats (principalmente en robledales, pinares y brezales) y construye sus redes generalmente en arbustos y en ramas i...

Desde Europa y Argelia al sur de Siberia....

Por GONZÁLEZ LÓPEZ, José Rafael

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/paidiscura-pallens.html>

### *Ensis ensis* (Linnaeus, 1758)

*Ensis ensis*, conocida como navaja o navaja curvada, es un molusco bivalvo de hasta 13 cm de longitud, de color blanco o crema con rayas o punteado roj...

Excava en la arena fina del litoral inferior e intermareal....

Desde Noruega al Mediterráneo y el NO de África....

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/ensis-ensis.html>

### *Donax trunculus* Linnaeus, 1758

La coquina es un molusco bivalvo de hasta 4 cm de longitud, de forma triangular alargada, equivalva, inequilateral, alargadas, con el exterior liso. L...

Vive en fondos arenosos en la zona de rompiente, hasta los 20 m de profundidad. La reproducción se produce externamente al animal. La coquina es



unisex...

Atlántico, desde Marruecos hasta la Bretaña francesa y Mediterráneo....

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/donax-trunculus.html>

## *Anacyclus clavatus* Pers.

Hierba anual con tallos de (4)15-45(80) cm, ligeramente estriados, erectos, ramificados generalmente desde la base, a veces en la mitad superior, glab...

Terrenos antropogénicos -borde de caminos, carreteras, vías férreas, cultivos, solares, tejados, empedrados, arenales costeros, márgenes de humedales ...

Mediterráneo, principalmente en la Península Ibérica, esporádica en el resto de Europa. Abundante en el C, E, y SE de la Península y esporádica en el ...

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/anacyclus-clavatus.html>

## **Nuevas especies incluidas en asturnatura.com**

*Buthus montanus* Lourenço & Vachon, 2004 (Arthropoda)

*Elymus pycnanthus* (Godr.) Melderis (Magnoliophyta)

*Lithosia quadra* (Linnaeus, 1758) (Arthropoda)

*Paidiscura pallens* (Blackwall, 1834) (Arthropoda)

*Patella aspera* Röding, 1798 (Mollusca)

*Scabiosa cinerea* Lapeyr. (Magnoliophyta)

*Scabiosa columbaria* subsp. *cinerea* (Lapeyr. ex Lam.) Font Quer (Magnoliophyta)

*Scabiosa columbaria* subsp. *columbaria* L. (Magnoliophyta)

*Scabiosa turolensis* Pau (Magnoliophyta)

*Scabiosa turolensis* subsp. *grosii* (Pau) Greuter & Burdet (Magnoliophyta)

ISSN 1887-5068



*Scabiosa turolensis subsp. turolensis* Pau (Magnoliophyta)

*Tenthredo olivacea* Klug, 1817 (Arthropoda)

