



Num. 764. Publicado el 18/11/2019

La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.

Fotografía: *Xerotricha zaratei*. Por José Rafael González López



Num. 764. Publicado el 18/11/2019

Descripciones de especies

Teira dugesii (Milne-Edwards, 1829)

Lagartija que puede alcanzar un tamaño (hocico a cloaca) de 8 cm, con una longitud de cola 1,7 veces la longitud de su cuerpo. Los machos son más gran...

Se encuentra en todo tipo de hábitats, tanto naturales como zonas urbanas, desde la zona mareal hasta 1.862 m de altitud. Su dieta es omnívora. Sus pre...

La especie es endémica de Madeira y ha colonizado Azores, Canarias, y Portugal....

Por GONZÁLEZ LÓPEZ, José Rafael

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/teira-dugesii.html>

Senecio varicosus L.f.

Hierba anual, erecta o más o menos decumbente. Tallos de 0,03-0,20 m, estriados, ramosos desde la base, con hojas persistentes, con pelos tectores plu...

Roquedos, terrenos pedregosos y arenales cerca del litoral; 0-200 m....

Endemismo de Mallorca y Menorca....

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/senecio-varicosus.html>

Rumex acetosa subsp. biformis (Lange) Castrov. & Valdés Berm.

Planta glabra o más o menos densamente papilosa en la base de los tallos y envés de las hojas, raramente en el haz, de 25-120(160) cm. Rizoma globoso-...

Rocas y acantilados litorales, tojales costeros venteados, en substrato silíceo; 0-100 m....

Costas del N de la Península [¿tal vez en Francia (Bretaña)?]....

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/rumex-acetosa-subsp-biformis.html>

Gryllus bimaculatus De Geer, 1773

Los imagos de *Gryllus bimaculatus* miden de 20 a 33 mm de longitud y tienen un diámetro corporal de unos 8 mm, ligeramente más grandes que el grillo de...

Se encuentran en diferentes tipos de hábitats, tanto secos como húmedos. Son omnívoros, consumiendo vegetales y pequeños animales, y no suele



darse el...

Originariamente circummediterráneo, se ha extendido por Europa y posteriormente por todo el mundo, habiéndose citado en Afganistán, Azores, Botsuan...

Por GONZÁLEZ LÓPEZ, José Rafael

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/gryllus-bimaculatus.html>

Anisodactylus binotatus (Fabricius, 1787)

Anisodactylus (*Anysodactylus*) *binotatus* es un coleóptero con un tamaño de 10 a 13 mm de coloración general negra, mate, con la cabeza y pronoto brilla...

Prados húmedos y zonas pantanosas; tierras de cultivo en suelos mal drenados....

De origen y distribución europea, en la actualidad se encuentra introducido en diferentes países de todo el mundo (Azores, Canadá, China, Kazajstán, N...

Por GONZÁLEZ LÓPEZ, José Rafael

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/anisodactylus-binotatus.html>

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Adiantum hispidulum Sw. (Magnoliophyta)

Anisodactylus binotatus (Fabricius, 1787) (Arthropoda)

Rumex acetosa L. (Magnoliophyta)

Rumex acetosella L. (Magnoliophyta)

Rumex acetosella subsp. *acetosella* L. (Magnoliophyta)

Rumex arifolius All. (Magnoliophyta)

Rumex dentatus subsp. *callosissimus* (Meisn.) Rech. fil. (Magnoliophyta)

Rumex palustris Sm. (Magnoliophyta)

Rumex papillaris Boiss. & Reut. (Magnoliophyta)



Rumex pulcher subsp. pulcher L. (Magnoliophyta)

Rumex roseus L. (Magnoliophyta)

Rumex rupestris Le Gall (Magnoliophyta)

Xerotricha zaratei (Gittenberger & Manga, 1977) (Mollusca)

