



Num. 768. Publicado el 16/12/2019

La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.

Fotografía: *Emberiza calandra*. Por José Rafael González López



Num. 768. Publicado el 16/12/2019

Descripciones de especies

Tanacetum corymbosum (L.) Sch.Bip.

Hierba perenne con un rizoma hasta de 10 mm de diámetro, horizontal u oblicuo, poco ramificado, con algunas rosetas estériles y tallos floríferos poco...

Orlas de encinar y robledal, o en sus matorrales de sustitución, sobre suelos más o menos profundos; 100- 1900(2000) m....

Distribuido por gran parte de Europa, Asia occidental y central, y Magreb. Mitad N y C de la Península, rara en las montañas béticas....

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/tanacetum-corymbosum.html>

Senecio inaequidens DC.

Subarbusto, leñoso en la mitad inferior, erecto, con tallos de 0,5-0,9 m, débilmente estriados, ramificados desde la base, con hojas en la parte media...

Taludes, escombreras, eriales, bordes de camino, prados, claros de bosque, dunas marítimas, etc.; 0-1800 m....

Originaria de Sudáfrica; naturalizada en diversos puntos de Europa, Australia, Canadá, México y Sudamérica. N de la Península, aunque relativamente ra...

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/senecio-inaequidens.html>

Senecio gallicus Chaix

Hierba anual, erecta, con tallos de 0,05-0,55 m, estriados, ramosos desde la base o la parte media, con hojas persistentes -rara vez caducas las infer...

Pinares, matorrales, pastizales, eriales, bordes de cultivo, dunas, con preferencia por suelos arenosos y sedimentarios, a veces sobre yesos; 0-1800 m...

Mediterráneo Occidental. Casi toda la Península excepto buena parte de la Cornisa Cantábrica y de los Pirineos....

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/senecio-gallicus.html>

Oxythyrea funesta (Poda, 1761)

Coleóptero de 8-10 mm, de color negro brillante, a veces bronceo, moteado de blanco y cubierto de cerdas blancas y largas. Pronoto decorado con manc...

Es un escarabajo florícola que se puede observar de abril a agosto y que se puede encontrar sobre arbustos, plantas ornamentales, árboles frutales, a ...



Presente en casi toda Europa excepto en las regiones septentrionales. Baleares, Córcega, Cerdeña y Sicilia. También en las Canarias y las Islas Britán...

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/oxythyrea-funesta.html>

Coccinula quatuordecimpustulata Linnaeus, 1758

Pequeño coleóptero de 3-4 mm, de cuerpo ovalado, redondeado y convexo, de color negro y amarillo. Tórax con una banda amarilla festoneada en la parte ...

Bastante común desde primavera hasta otoño en lugares abiertos tales como linderos y claros forestales, bosques claros, landas, páramos, campos y huer...

Casi toda Europa, incluida Córcega, Cerdeña y Sicilia, pero ausente de Baleares, Porgutal y las Islas Británicas....

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/coccinula-quatuordecimpustulata.html>

