



Num. 770. Publicado el 30/12/2019

La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.

Fotografía: *Corvus cornix*. Por Juan Luis Menéndez



Num. 770. Publicado el 30/12/2019

Descripciones de especies

Otala lactea subsp. lactea (O.F. Müller, 1774)

Caracol con un tamaño de 26 a 40 mm de diámetro y de 18 a 24 mm de altura. Concha grande, globosa, algo deprimida, sólida, gruesa y brillante; color q...

Vive desde el nivel del mar hasta los 800m, en hábitats muy variados (roquedos, muros ruinas, bordes de caminos, huertas, jardines, montes y cultivos ...

Mitad sur de España y Portugal desde la costa, Baleares, Canarias, Azores, Madeira ...

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/otala-lactea-subsp-lactea.html>

Melanitta nigra (Linnaeus, 1758)

El negrón común es un ave de 44-54 cm de longitud y 70-84 cm de envergadura. Se trata de una anátida marina de plumaje muy oscuro, con ele pico ancho ...

Durante la época de cría el negrón común vive en zonas interiores de regiones cubiertas por tundras o vegetación baja, aunque también puede aparecer e...

Este pato se reproduce en una estrecha franja del norte de Europa (islas Británicas, Escandinavia, norte de Rusia e Islandia) y Norteamérica. Inverna ...

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/melanitta-nigra.html>

Artemisia absinthium L.

Hierba perenne más o menos lignificada en la base, rizomatosa, seríceo, fuertemente aromática. Tallos de (30)40-60(100) cm, ramificados desde la base,...

Herbazales nitrófilos, escombreras, cunetas, baldíos, en general en lugares con suelo nitrificado y removido; (5)200-2000(2600) m....

Europa, salvo el extremo N, Asia y N de África; introducida en América. Mitad N de la Península Ibérica, más rara en el SE....

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/artemisia-absinthium.html>

Agrypnus murinus (Linnaeus, 1758)

Coleóptero de 11-17 mm de longitud, de color negro, con el cuerpo ancho y convexo cubierto de pelos grisáceos y escamas blancas que le dan un aspecto ...



Rizófago, su larva ataca las raíces de árboles jóvenes y gramíneas cultivadas. Aparece entre abril y junio....

Toda Europa excepto Portugal y las islas mediterráneas....

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/agrypnus-murinus.html>

Adalia bipunctata (Linnaeus, 1758)

Pequeño escarabajo de 4-5 mm, de cuerpo ovalado redondeado y convexo, liso y de color y aspecto muy variable, habiéndose descrito hasta 24 variaciones...

Es común en casi todas partes, tanto en la ciudad como en el campo, pero está en regresión desde hace algunos años frente a *Harmonia axyridis*. Se la e...

Toda Europa....

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/adalia-bipunctata.html>

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Corvus cornix Linnaeus, 1758 (Chordata)

Lycopodiella cernua (L.) Pic. Serm. (Pteridophyta)

