



Num. 773. Publicado el 20/01/2020

La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.

Fotografía: *Bombycilaena erecta*. Por Juan Luis Menéndez



Num. 773. Publicado el 20/01/2020

Descripciones de especies

Tragopogon castellanus Levier in Leresche & Levier

Hierba bienal o perenne de 30-60(80) cm, no escaposa, multicaule; rizoma grueso, fusiforme, escamoso-lanuginoso en el ápice. Tallos erectos o ascendentes...

Bosques de caducifolios, matorrales y pastizales subnitrófilos húmedos, en substrato calizo, margoso, salino y yesoso, a veces en terrenos arenosos si...

Principalmente en la mitad N de la Península Ibérica. ...

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/tragopogon-castellanus.html>

Filago pyramidata L.

Hierba anual, densamente pelosa, con indumento grisáceo. Tallos de 1,5-60 cm, de erectos a ascendentes, simples o ramificados solo en la inflorescenci...

Márgenes de camino, barbechos, cultivos, claros de bosques y matorral, pastos terofíticos en laderas secas y pedregosas, acantilados costeros, zonas r...

Centro y sur de Europa, N de África y SW de Asia. Distribuida por toda la Península Ibérica y Baleares....

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/filago-pyramidata.html>

Filago arvensis L.

Hierba anual, densamente pelosa, con indumento de grisáceo a grisáceo-blancocino. Tallos de 5-50(70) cm, de erectos a ascendentes, simples o ramifica...

Márgenes de camino, barbechos, cultivos, bosques abiertos, matorrales, pastos terofíticos en laderas secas y pedregosas, zonas ruderalizadas, indifere...

Regiones Eurosiberiana, Mediterránea e Irano-Turánica, desde la Península Ibérica a Mongolia y desde el N de África hasta la Península Escandinava. Di...

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/filago-arvensis.html>

Corvus cornix Linnaeus, 1758

Ave con una longitud de 45 a 50 cm y una envergadura alar de 84 a 100 cm. con un peso de unos 500 gr. Hasta hace poco se la consideraba una subespecie...



Corvus cornix habita los campos abiertos, los bosques, e incluso se puede ver en parques y basureros. Las distintas poblaciones pueden comportarse co...

Distribución Paleártica, desde Francia hasta Rusia, pasando por el Reino Unido e Irlanda del Sur. Falta en el centro y sur de Italia, pero si está pre...

Por GONZÁLEZ LÓPEZ, José Rafael

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/corvus-cornix.html>

Bombycilaena erecta (L.) Smoljan.

Hierba anual, densamente pelosa, con indumento de grisáceo a grisáceo-blancuecino. Tallos de 4-22 cm. Hojas caulinares de 3-18 x 1,2-5,5 mm, más o meno...

Pastos terofíticos en márgenes de camino, zonas abiertas, barbechos, principalmente en substratos básicos; 0-2100 m....

Europa, desde la Península Ibérica y Reino Unido hasta Turquía y Rusia, SW de Asia y NW de África. Distribuida por casi toda la Península, pero muy es...

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/bombycilaena-erecta.html>

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Bombycilaena discolor (Pers.) M. Laínz (Magnoliophyta)

Filago fuscescens Pomel (Magnoliophyta)

Filago lutescens Jord. (Magnoliophyta)

Filago mareotica Delile (Magnoliophyta)

Filago ramosissima Lange (Magnoliophyta)

Gamochaeta subfalcata (Cabrera) Cabrera (Magnoliophyta)

Hedypnois cretica (L.) Dum. Cours. (Magnoliophyta)

Logfia gallica (L.) Coss. & Germ. (Magnoliophyta)

Tragopogon pseudocastellanus Blanca & C. Díaz (Magnoliophyta)

