



## Num. 775. Publicado el 03/02/2020

*La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.*

Fotografía: *Alectoris barbara*. Por José Rafael González López



**Num. 775. Publicado el 03/02/2020**

## Descripciones de especies

*Serinus canaria* (Linnaeus, 1758)

Pequeño fringílido de 13 cm de longitud y 20-23 cm de envergadura, pequeño, piquicorto y de tonos verdosos. Tanto machos como hembras tienen el plumaj...

Ocupa una gran variedad de ambientes y puede observarse desde el nivel del mar hasta los 2.000 metros. Para criar se suele instalar en parajes arbolad...

Se trata de un pájaro sin subespecies descritas, distribuido básicamente por Madeira, Azores y las islas Canarias. Ha sido introducido en Bermudas, Ha...

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/serinus-canaria.html>

*Pararge xiphioides* Staudinger, 1871

Satírido endémico de las Canarias, con una envergadura alar de 40 a 45 mm. Color de las alas pardo con manchas de color naranja en la parte superior; ...

Produce varias generaciones al año y se encuentra desde la costa hasta las cumbres montañosas, en todo tipo de hábitats, incluso en zonas fuertemente ...

Puede encontrarse en las islas de Tenerife, Gran Canaria, La Gomera, El Hierro y La Palma....

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/pararge-xiphioides.html>

*Filago pygmaea* L.

Hierba anual, densamente pelosa, con indumento grisáceo. Tallos de 0,5-12 cm, de erectos a ascendentes, simples o ramificados desde la base de la plan...

Barbechos, bordes de camino, pastos terofíticos en claros de bosque o matorral, encinares adherados, aluviones, en general en lugares más o menos rud...

Región Mediterránea, desde la Península Ibérica hasta Turquía y desde Marruecos hasta Siria. Casi todas las provincias del C y S de la Península, punt...

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/filago-pygmaea.html>

*Erigeron alpinus* L.

Hierba perenne, con rizoma de 1,8-5,5 mm de diámetro, subvertical y ramificado, cubierto en su parte superior por restos foliares, del que nacen



raíce...

Pastos pedregosos, herbazales, márgenes de arroyo, roquedos, fisuras de roca, crestas y cumbres, indiferente edáfico; (1100)1400-2600(3100) m....

Montañas del C y S de Europa y del Líbano. N de la Península, Pirineos y Cordillera Cantábrica principalmente....

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/erigeron-alpinus.html>

## *Anthus berthelotii* Bolle, 1862

Pequeño bisbita de 14 cm de longitud y 22 de envergadura, de aspecto grisáceo. Presenta las partes superiores de color pardo gris, tenuemente raya...

El bisbita caminero ocupa todos los medios de Canarias, tanto llanos como montañosos, desde el nivel del mar hasta los 3.000 metros de altitud, a exce...

Es un endemismo macaronésico presente en los archipiélagos de Canarias, Madeira y Salvajes. Cuenta con dos subespecies reconocidas: madeirensis en Mad...

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/anthus-berthelotii.html>

## **Nuevas especies incluidas en asturnatura.com**

*Alectoris barbara* (Bonnaterre, 1790) (Chordata)

*Ancistrocerus haematodes* (Brullé, 1839) (Arthropoda)

*Anthus berthelotii* Bolle, 1862 (Chordata)

*Chaenorhinum grandiflorum subsp. grandiflorum* (Coss.) Willk. (Magnoliophyta)

*Chaenorhinum raveyi* (Boiss.) Pau (Magnoliophyta)

*Chaenorhinum robustum* Loscos (Magnoliophyta)

*Chaenorhinum rubrifolium subsp. rubrifolium* (Robill. & Castagne ex DC.) Fourr. (Magnoliophyta)

*Chaenorhinum serpyllifolium* (Lange) Lange (Magnoliophyta)

*Chaenorhinum serpyllifolium subsp. lusitanicum* R. Fern. (Magnoliophyta)



*Chaenorhinum serpyllifolium subsp. serpyllifolium* (Lange) Lange (Magnoliophyta)

*Cyanistes teneriffae* Lesson, 1831 (Chordata)

*Grapsus adscensionis* (Osbeck, 1765) (Arthropoda)

*Larus michahellis subsp. lusitanus* Joiris, 1978 (Chordata)

*Larus michahellis subsp. michahellis* Naumann, 1840 (Chordata)

*Pararge xiphioides* Staudinger, 1871 (Arthropoda)

*Phylloscopus canariensis* (Hartwig, 1886) (Chordata)

*Serinus canaria* (Linnaeus, 1758) (Chordata)

*Ulex gallii subsp. gallii* Planch (Magnoliophyta)

*Urtica stachyoides* Webb & Berthel. (Magnoliophyta)

*Vanessa vulcania* Godart, 1819 (Arthropoda)

