



Num. 789. Publicado el 11/05/2020

La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.

Fotografía: *Dryopteris guanchica*. Por Ignacio Fernández Villar



Num. 789. Publicado el 11/05/2020

Descripciones de especies

Vicia pseudocracca Bertol.

Hierba anual, trepadora, glabra o esparcidamente pubescente, con pelos de 0,5 mm, adpresos. Tallos hasta de 60 cm, procumbentes, angulosos. Hojas de 22...

Pastizales, cultivos, herbazales y claros del matorral, con frecuencia en terrenos arenosos o pedregosos; 0-1550 m. ...

Península Ibérica, S de Francia, Italia, islas del Mediterráneo occidental, NW de África y Canarias (Tenerife). Casi todo el territorio de nuestra Flo...

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/vicia-pseudocracca.html>

Senecio boissieri DC.

Hierba perenne, erecta, con tallos de 0,03-0,15 m, débilmente estriados, sin ramas, escapiformes, con la mayoría de las hojas agrupadas en una roseta ...

Litosuelos en collados venteados, gleras, praderas pedregosas y claros de pional; (1750)2100-3300 m....

Picos de Europa, Sierra del Brezo, Peña Prieta, Pirineos centrales, Sierra de Guadarrama y Sierras Béticas orientales (Sierra Nevada, Sierra de Baza, ...

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/senecio-boissieri.html>

Saxifraga felineri P. Vargas

Planta perenne, pulvinular -pulvínulos de hasta 50 cm de diámetro-, formada por numerosas rosetas columnares de 0,75-1 cm de diámetro, con indumento d...

Fisuras de roquedos calizos; (500)1200-2200(2500) m....

Especie endémica de los Picos de Europa y aledaños....

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/saxifraga-felineri.html>

Rhinocyllus conicus (Frölich, 1792)

Gorgojo de 3 a 4 mm de longitud, de cuerpo alargado, negro, convexo, subparalelo; revestido de una pubescencia sencilla marrón y cenicienta no aplicad...

La larva vive y se desarrolla en los capítulos de numerosos cardos (*Cirsium arvense*, *Cirsium palustre*, *Cirsium anglicum*, *Cirsium lanceolatum*, *Carduus* ...



De distribución europea y norteafricana se ha llevado a EEUU para control biológico de cardos....

Por GONZÁLEZ LÓPEZ, José Rafael

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/rhinocyllus-conicus.html>

Euborellia moesta (Gené, 1839)

Insecto con una longitud, sin el fórceps, de 11 a 15 mm. Color negro brillante, rara vez castaño. Las antenas tienen 18 artejos, son ferruginosas y es...

Especie termofílica, frecuente en las formaciones del bioclima mediterráneo, y en particular en los maquis bajos, pero también en formaciones estepari...

Común en el litoral mediterráneo occidental (España, Francia, Italia, Marruecos, Argelia, Túnez) habiendo sido citada en Dalmacia y en Irán....

Por GONZÁLEZ LÓPEZ, José Rafael

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/euborellia-moesta.html>

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Asparagus albus L. (Magnoliophyta)

Asparagus officinalis L. (Magnoliophyta)

Leucanthemum cantabricum Sennen (Magnoliophyta)

Leucanthemum eliasii (Sennen & Pau) Vogt, Konowalik & Oberpr. (Magnoliophyta)

Leucanthemum gallaecicum Rodr. Oubiña & S. Ortiz (Magnoliophyta)

Malcolmia triloba (L.) Spreng. (Magnoliophyta)

Matricaria discoidea DC. (Magnoliophyta)

Phlomis crinita Cav. (Magnoliophyta)

Phlomis crinita subsp. malacitana (Pau) Cabezudo, Nieto Caldera & F.B. Navarro (Magnoliophyta)

Votgia annua (L.) Oberpr. & Sonboli (Magnoliophyta)

ISSN 1887-5068



Votgia microphylla (DC.) Oberpr. & Sonboli (Magnoliophyta)

