



Num. 809. Publicado el 28/09/2020

La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.

Fotografía: *Caprella santosrosai*. Por Ricardo R. Fdez



Num. 809. Publicado el 28/09/2020

Descripciones de especies

Inula helenioides DC.

Hierba perenne, rizomatosa, con rizoma más o menos delgado, vilosa, seríceo-vilosa o tomentoso-vilosa, con pelos tectores de (0,2)1-5(6) mm y glándula...

Pastos algo húmedos, herbazales, praderas juncuales, ribazos y cunetas, en substratos básicos (calizas, margas y yesos) o más raramente silíceos (arena...

Occidente de la Región Mediterránea: SE de Francia y España peninsular. Frecuente en el cuadrante NE peninsular, se extiende a otras zonas del C, hast...

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/inula-helenioides.html>

Dianthus pungens subsp. brachyanthus (Boiss.) M. Bernal, Fern. Casas, G. López, M. Laínz & Muñoz Garm.

Planta muy variable, no alcanzando sus tallos los 10 cm en las grandes altitudes. Hojas típicamente cortitas y más o menos planas, triangulares o casi ...

Pastos y matorrales aclarados, en suelos pedregosos y en roquedos; indiferente al substrato; 500-3400 m....

Península Ibérica y zonas montañosas del Rif. Sierras de Andalucía, Sistema Central, Sistema Ibérico, alcanzando la Cordillera Cantábrica y el Prepiri...

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/dianthus-pungens-subsp-brachyanthus.html>

Cheirolophus intybaceus (Lam.) Dostál

Planta sufruticosa, inerme, verde, con pelos unicelulares y glándulas punctiformes. Tallos hasta de 1,5 m, erectos, ascendentes o procumbentes, muy ra...

Matorrales aclarados, roquedos, bordes de camino, acantilados, etc., en zonas secas y soleadas, en suelos preferentemente básicos, a menudo nitrificad...

Oeste de la Región Mediterránea -España, SE de Francia y Córcega-. E de España -penetra al interior por el valle del Ebro- e Islas Baleares....

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/cheirolophus-intybaceus.html>

Centaurea triumfetti subsp. semidecurrrens (Jord.) Dostál

Hierba perenne, rizomatosa, con rizoma corto y de entrenudos inconspicuos, inerme, verde, de un verde oliváceo o grisácea, con pelos tectores flageli...



Quejigares, bosques mixtos, matorrales y praderas en suelos profundos, así como en roquedos calizos propios de áreas submediterráneas; 520-1800 m....

Sur y SO de Europa. Cuadrante NE de España....

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/centaurea-triumfetti-subsp-semidecurrens.html>

Caprella santosrosai Guerra-García, Sánchez-Moyano & García Gómez, 2001

Caprélido con de 8.6 mm los machos y 4.5 mm las hembras, según la descripción del holotipo. Cabeza provista una espina dorsal dirigida hacia delante; p...

Sobre diversos hidrozoos y tubos de anélidos....

Tan sólo existen dos citas anteriores a la presente. La primera corresponde con la de su descripción, a partir de ejemplares recogidos en el exterior ...

Por FERNÁNDEZ, Ricardo Roberto

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/caprella-santosrosai.html>

Novidades corológicas

Caprella santosrosai Guerra-García, Sánchez-Moyano & García Gómez, 2001 (Arthropoda)

<p>Primera cita para el Cantábrico y tercera de la Península Ibérica.</p><p>Tan sólo existen dos citas anteriores a la presente. La primera corresponde con la de su descripción, a partir de ejemplares recogidos en el exterior del muelle del puerto de Gibraltar (36°8'&N; 5°21'&W), entre 10 y 30 metros de profundidad sobre Bugula neritina. La segunda cita corresponde a la playa de Aguda y Belinho, a lo largo de la costa noroeste de Portugal, siendo recolectado sobre arrecifes del sabélido Sabellaria alveolata.</p><p>La presente cita, a la cual pertenecen los especímenes fotografiados, corresponden a una muestra recogida mediante buceo en el bajo conocido como El petón de fuera o Petón Serrape, en Foz (Lugo) (43 34.988&N; 7° 11.018&W) el día 27 de julio de 2020. Los animales se encontraban sobre una mata del hidroideo Amphisbetia operculata, recolectada a unos 25 metros de profundidad. También ha aparecido sobre el briozoo Bugula neritina y sobre arrecifes de Sabellaria alveolata. También ha aparecido sobre el briozoo Bugula neritina y sobre arrecifes de Sabellaria alveolata.</p> - Citado por Ricardo R. Fdez en FOZ (CASCO URBANO), Lugar conocido como El petón de fuera o Petón Serrape, Foz. LUGO el día 21/09/2020

Más información en <http://www.asturnatura.com/fotografia/fauna-invertebrados/caprella-santosrosai-1/35501.html>

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Cecropis daurica (Laxmann, 1769) (Chordata)

Iphiclides podalirius Linnaeus, 1758 (Arthropoda)



Picnomon acarna (L.) Cass. (Magnoliophyta)

Taraxacum ekmanii Dahlst. (Magnoliophyta)

