



## Num. 82. Publicado el 03/07/2006

*La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.*

Fotografía: *Aix galericulata*. Por César Fernández González



**Num. 82. Publicado el 03/07/2006**

## Descripciones de especies

### *Tragopogon pratensis* L.

Hierba anual o bienal de 15-35(50) cm, no escaposa, unicaule o multicaule; rizoma grueso, fusiforme, escamoso y lanuginoso en el ápice. Tallos erectos...

Herbazales, pastizales y taludes algo nitrificados, preferentemente en substrato calizo; 800-2300 m....

Europa y W de Asia. Dispersa por casi toda la Península Ibérica, falta en el tercio occidental....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/tragopogon-pratensis.html>

### *Tamus communis* L.

Hierba perenne y glabra, provista de un tubérculo cilíndrico más o menos irregular que mide unos 20 cm. De él surge un tallo cilíndrico trepador, va g...

Presente en linderos de bosques, setos, formaciones ribereñas, en suelos generalmente calcáreo....

Presente en el centro y sur de Europa, NO de África (oriente medio y regiones costeras de Turquía y el Cáucaso) y O de Asia....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/tamus-communis.html>

### *Potentilla montana* Brot.

Hierba vivaz, postrada, con cepa leñosa de hasta casi 9 mm de diámetro; tallos rastreros, procumbentes, que enraízan en los nudos, con una pilosidad d...

Presente en pastizales acidófilos y en matorrales sobre calizas descarbonatadas, claros de bosques, brezales y tojales. Desde el nivel del mar a los 1...

Mitad norte de la Península y centro y oeste de Francia....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/potentilla-montana.html>

### *Ononis reclinata* L.

Hierba anual, hasta de 25 cm, erecta, ascendente o decumbente. Tallos ramificados en la base, peloso-glandulosos, con pelos no glandulíferos más largo...



Pastizales de orla de bosques, dunas, roquedos y pedregales, en substrato frecuentemente básico; 0-1000 m. IV-VII(VIII). Región mediterránea, Islas Ca...

Casi toda la Península Ibérica –más rara en el extremo NW– y Baleares....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/ononis-reclinata.html>

## *Malva sylvestris* L.

Hierba anual o perenne, con tallos erectos o ascendentes, que alcanzan los 150 cm de altura y ligeramente pilosos. Las hojas basales, de 5 - 10 cm, son...

Vive en bordes de caminos, cultivos abandonados, en zonas generalmente nitrificadas, en zonas abiertas y bien iluminadas en suelos de pH generalmente ...

Europa, norte de África, SO de Asia y Madeira....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/malva-sylvestris.html>

## *Limosa limosa* (Linnaeus, 1758)

Mide unos 40 cm, el ala puede alcanzar los 23 cm, su altura puede llegar a 23 cm y su envergadura a 70 cm. Su rasgo más característico son las patas y...

Es frecuente en prados y campos trabajados por el hombre; en zonas de aguas con poca profundidad y donde haya arena o lodos, donde pasará la noche. Se...

Islandia, Escandinavia, Rusia, hasta el norte de África....

Por OLIVEROS PÉREZ, Jesús

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/limosa-limosa.html>

## *Leucosolenia variabilis* Haeckel, 1870

Esponja de fácil identificación, al estar formada por una reticulación basal de tubos con una pared fina y de los que surgen otros erectos bastante nu...

Suele crecer en aguas poco profundas, donde suele existir una mezcla de sedimentos. Vive sobre pequeños parches de conchas, ascidias y en rocas horizo...

Desde el Ártico al Mediterráneo....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/leucosolenia-variabilis.html>



## *Hordeum murinum* L.

Planta anual, con tallos de hasta 50 cm de altura, erectos o ascendentes. Hojas normalmente aplanadas, de 2 a 8 mm de anchura, glabras o ligeramente p...

Zonas alteradas, como baldíos y cunetas. Generalmente en zonas soleadas y suelos secos o ligeramente húmedos. Aparece en comunidades ruderales subnitr...

Europa y norte de África....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/hordeum-murinum.html>

## *Flabellina babai* Schmekel, 1972

Nudibranquio de cuerpo alargado que puede alcanzar los 50 mm de longitud. Tentáculos orales largos y rinóforos lamelados, más cortos que los tentáculo...

Vive en fondos rocosos. No es una especie abundante...

Mediterráneo, costa atlántica de España, Portugal y Senegal....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/flabellina-babai.html>

## *Codium bursa* (Linnaeus) C. Agardh

Alga verde con forma esferoidal aplanada, de textura aterciopelada y que alcanza los 30 cm de diámetro; está fijado al sustrato por una maraña de fila...

Vive fijado a conchas y rocas en el sublitoral hasta los 10 m de profundidad, generalmente en pequeños grupos en zonas calmadas....

Desde la costa de Bélgica y las Islas Británicas a Portugal, el Mediterráneo, Canarias y el Adriático....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/codium-bursa.html>

## **Nuevas especies incluidas en asturnatura.com**

*Bolboschoenus maritimus* (L.) Palla (Magnoliophyta)

*Carex extensa* (Magnoliophyta)



*Centaurium scilloides* (Magnoliophyta)

*Coenonympha arcania* (Linnaeus, 1761) (Arthropoda)

*Epilobium angustifolium* L. (Magnoliophyta)

*Epilobium hirsutum* L. (Magnoliophyta)

*Onychogomphus uncatus* (Charpentier, 1840) (Arthropoda)

*Polyommatus ripartii* (Freyer, 1830) (Arthropoda)

*Spergularia rupicola* Lebel ex Le Jol. (Magnoliophyta)

*Tradescantia fluminensis* Vell. (Magnoliophyta)

