



Num. 821. Publicado el 21/12/2020

La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.

Fotografía: *Laurus nobilis*. Por Ignacio Fernández Villar



Num. 821. Publicado el 21/12/2020

Descripciones de especies

Zeuneriana burriana (Uvarov, 1935)

Machos con una longitud de 16 a 22mm y hembras de 16,5 a 21mm con un ovipositor de 8 a 9mm de longitud. De coloración general parda. Vértex con frecu...

Se distribuye desde el nivel del mar hasta cerca de los 2000 msnm en los Picos de Europa. Los adultos se pueden observar de mayo a noviembre....

Especie endémica del noroeste español se ha citado en Asturias, Cantabria, Guipúzcoa y Orense....

Por GONZÁLEZ LÓPEZ, José Rafael

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/zeuneriana-burriana.html>

Saxifraga fragosoi Sennen

Planta perenne, cespitosa, postrada, decumbente, más o menos viscosa, con indumento de glándulas -sésiles y estipitadas-, y de pelos glandulíferos y n...

Fisuras y repisas de roquedos, en substrato ácido; (300)600-1800(2200) m. ...

Zonas montañosas del S de Francia y mitad N de la Península Ibérica. ...

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/saxifraga-fragosoi.html>

Lecanora rupicola (L.) Zahlbr.

Liquen saxícola con talo continuo, fisurado o areolado, areolas planas o convexas; color gris, verdoso o más o menos parduzco; superficie más o menos ...

Preferentemente en roquedos ricos en minerales, tanto en superficies horizontales como verticales, pero rara vez en extraplomos. Más o menos Neutrófit...

Holártica, boreal templada....

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/lecanora-rupicola.html>

Cladanthus mixtus (L.) Chevall.

Hierba anual, raramente bienal, más o menos pubescente -por excepción glabrescente-, algo aromática. Tallos de (8)20-40(65) cm, a veces muy robustos, ...

Pastos ruderalizados y campos; 0-1000(1300) m. ...



Región Mediterránea, SW de Asia y Macaronesia; introducida en norteamérica. Casi toda la Península, aunque poco frecuente en el nE, e Islas Baleares. ...

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/cladanthus-mixtus.html>

Calendula arvensis L.

Hierba anual con tallos de (2)17,3-45,5(80) cm, de ascendentes a erectos, a veces decumbentes, ramificados desde la base, con pelos glandulíferos y te...

Baldíos, campos cultivados, herbazales en el margen de caminos y cunetas, en suelos más o menos nitrificados; 0-1300 m....

Centro y sur de Europa, N de África, SW de Asia y Macaronesia; introducida en otras partes del globo como Australia y California. Dispersa por toda la...

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/calendula-arvensis.html>

