



## Num. 83. Publicado el 10/07/2006

*La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.*

Fotografía: *Pestalotiopsis disseminata*. Por Enrique Rubio Domínguez



**Num. 83. Publicado el 10/07/2006**

## Descripciones de especies

*Suaeda vera* Forssk. ex J.F. Gmel.

Planta perenne leñosa, con tallos de entre 10 y 80 cm, no articulados como otras especies de la familia, de postrados a erectos y glabros. Las hojas so...

Vive en el litoral en marismas y saladares, en suelos secos, arenosos y salobres de la marisma externa halófila en la zona más alta del supraestero qu...

Costa atlántica de Inglaterra, Francia y España y Región Mediterránea. Sólo se conocen dos poblaciones en el litoral cantábrico....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/suaeda-vera.html>

*Spergularia rupicola* Lebel ex Le Jol.

Planta perenne, provista de una cepa leñosa. Sus tallos miden entre 5 y 35 cm, son robustos, algo comprimidos y engrosados en los nudos, decumbentes o...

Vive en grietas y rellanos de acantilados marítimos....

Costa atlántica europea....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/spergularia-rupicola.html>

*Reichardia gaditana* (Willk.) Cout.

Planta bianual o perenne, con tallos erectos y glaucos de entre 4 y 35 cm. Las hojas basales, de 2 - 17 x 0.5 - 7 cm, son oblanceoladas, entre obtusas...

Esta planta se encuentra en dunas secundarias o grises del litoral que se incluirían en las comunidades vegetales pertenecientes al Orden Crucianellet...

Costa atlántica de la Península y noroeste de Marruecos....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/reichardia-gaditana.html>

*Lolium perenne* L.

Planta perenne, de entre 8 y 90 cm de altura. Los tallos tienen 2 - 4 nudos y tiene hojas de 5 - 14 x 2 - 4 mm, agudas, glabras, brillantes en el envé...



Vive en prados, pastizales y también en bordes de camino. Se puede incluir en comunidades vegetales pertenecientes a la Clase Molinio - Arrhenatherete...

Casi toda Europa, pero introducida en el norte....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/loium-perenne.html>

## *Limosa lapponica* (Linnaeus, 1758)

Mide unos 38 cm, el ala puede alcanzar los 23 cm, su altura puede llegar a 21 cm y su envergadura a 68 cm. Las patas son más cortas que las de la coli...

Sustituye a la aguja colinegra en el norte. Cría en marismas, en terrenos pantanosos, etc. Se trata de una ave migradora que muestra actitud gregaria ...

Toda Eurasia y parte de Alaska, no incluye el resto de la zona ártica de Norteamérica....

Por OLIVEROS PÉREZ, Jesús

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/limosa-lapponica.html>

## *Leucanthemum vulgare* Lam.

Planta perenne, con tallos que pueden alcanzar hasta 1 m de altura. En la base tiene una roseta de hojas de 1.5 a 10 cm, obovadas - espatuladas a oblo...

Se encuentra en prados de siega más o menos húmedos y abonados y también en los bordes de caminos y orlas y claros de bosques. Se puede incluir en com...

Presente en toda Europa....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/leucanthemum-vulgare.html>

## *Herniaria ciliolata subsp. robusta* Chaudhri

Hierba perenne, con tallos de hasta 30 cm de longitud, postrados y bastante ramificados; tienen pubescencia retrorsa en todo el contorno de jóvenes y ...

Vive en dunas, roquedos marinos y zonas encharcadas....

Costa atlántica francesa y de la Península Ibérica. Se trata de una planta muy escasa, de la que apenas existen poblaciones en el litoral cantábrico....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/herniaria-ciliolata-subsp-robusta.html>



## *Galeus melastomus* Rafinesque, 1810

Pequeño elasmobranquio de cuerpo alargado y delgado que puede alcanzar los 75 cm en los machos y 90 en las hembras. La cabeza es aplanada y tiene el h...

Se trata de una especie bentónica que vive en fondos de arena, fango y grava entre 55 y 1200 m de profundidad. Tiene comportamiento nocturno. Se alime...

Desde las Islas Feroe y Noruega a Senegal y el Mediterráneo....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/galeus-melastomus.html>

## *Carex extensa* Gooden.

Planta densamente cespitosa con un rizoma endoble. Las vainas de las hojas basales son de color pardo y enteras. Los tallos fértiles miden entre 15 y ...

Vive en aguas salobres de marismas costeras y también en zonas húmedas continentales de salinidad elevada. Aparece en el supraestero en suelos arenoso...

Costa europea y mediterránea....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/carex-extensa.html>

## *Bolboschoenus maritimus* L.

Planta perenne rizomatosa, con tallos de 30 - 120 cm, trígono y escábridos en la parte superior. Las hojas son planas y están bien desarrolladas, midi...

Vive en suelos de mesohalinos a oligohalinos permanentemente húmedos, fangosos, en marismas subhalófilas, ya sea en los canales que drenan el agua del...

Toda la costa europea....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/bolboschoenus-maritimus.html>

## **Nuevas especies incluidas en asturnatura.com**

*Aglais urticae* (Linnaeus, 1758) (Arthropoda)



*Boloria pales* (Denis & Schiffermüller, 1775) (Arthropoda)

*Frankenia laevis* L. (Magnoliophyta)

*Gonepteryx cleopatra* (Linnaeus, 1767) (Arthropoda)

*Gonepteryx rhamni* (Linnaeus, 1758) (Arthropoda)

*Lavatera cretica* L. (Magnoliophyta)

*Satyrium esculi* (Arthropoda)

*Spiranthes aestivalis* (Poir.) Rich. (Magnoliophyta)

*Thymus mastichina* (L.) L. (Magnoliophyta)

*Verbena officinalis* L. (Magnoliophyta)

ISSN 1887-5068



9 771887 506008