



Num. 83. Publicado el 10/07/2006

La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.

Fotografía: *Pestalotiopsis disseminata*. Por Enrique Rubio Domínguez



Num. 83. Publicado el 10/07/2006

Descripciones de especies

Suaeda vera Forssk. ex J.F. Gmel.

Planta perenne leñosa, con tallos de entre 10 y 80 cm, no articulados como otras especies de la familia, de prostrados a erectos y glabros. Las hojas so...

Vive en el litoral en marismas y saladares, en suelos secos, arenosos y salobres de la marisma externa halófila en la zona más alta del supraestero qu...

Costa atlántica de Inglaterra, Francia y España y Región Mediterránea. Sólo se conocen dos poblaciones en el litoral cantábrico....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/suaeda-vera.html>

Spergularia rupicola Lebel ex Le Jol.

Planta perenne, provista de una cepa leñosa. Sus tallos miden entre 5 y 35 cm, son robustos, algo comprimidos y engrosados en los nudos, decumbentes o...

Vive en grietas y rellanos de acantilados marítimos....

Costa atlántica europea....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/spergularia-rupicola.html>

Reichardia gaditana (Willk.) Samp.

Hierba anual, bienal o perennizante, hasta de 70 cm, caulescente, glabrescente. Tallos herbáceos, a veces leñosos en la base, erectos, foliosos, muy r...

Arenales costeros, en dunas secundarias. 0-20 m....

NO de Marruecos y Península Ibérica. Costa de la mitad W de la Península Ibérica, desde Oviedo hasta Marbella (Málaga)....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/reichardia-gaditana.html>

Lolium perenne L.

Planta perenne, de entre 8 y 90 cm de altura. Los tallos tienen 2 - 4 nudos y tiene hojas de 5 - 14 x 2 - 4 mm, agudas, glabras, brillantes en el envé...



Vive en prados, pastizales y también en bordes de camino. Se puede incluir en comunidades vegetales pertenecientes a la Clase Molinio - Arrhenatherete...

Casi toda Europa, pero introducida en el norte....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/loium-perenne.html>

Limosa lapponica (Linnaeus, 1758)

Mide unos 38 cm, el ala puede alcanzar los 23 cm, su altura puede llegar a 21 cm y su envergadura a 68 cm. Las patas son más cortas que las de la coli...

Sustituye a la aguja colinegra en el norte. Cría en marismas, en terrenos pantanosos, etc. Se trata de una ave migradora que muestra actitud gregaria ...

Toda Eurasia y parte de Alaska, no incluye el resto de la zona ártica de Norteamérica....

Por OLIVEROS PÉREZ, Jesús

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/limosa-lapponica.html>

Leucanthemum vulgare Lam.

Hierba bienal o de vida corta, con un débil sistema radical. Tallos de (10)15-70(100) cm, solitarios o numerosos, de erectos a ascendentes, no ramific...

Orillas de camino, cunetas, pastizales degradados, en ambientes ruderales o antropizados; 10-1500 m....

Europa, actualmente naturalizada en muchas regiones templadas de ambos hemisferios. Mitad N de la Península Ibérica, principalmente....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/leucanthemum-vulgare.html>

Herniaria ciliolata subsp. *robusta* Chaudhri

Hierba perenne, con tallos de hasta 30 cm de longitud, prostrados y bastante ramificados; tienen pubescencia retrorsa en todo el contorno de jóvenes y ...

Vive en dunas, roquedos marinos y zonas encharcadas....

Costa atlántica francesa y de la Península Ibérica. Se trata de una planta muy escasa, de la que apenas existen poblaciones en el litoral cantábrico....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/herniaria-ciliolata-subsp-robusta.html>

Galeus melastomus Rafinesque, 1810



Pequeño elasmobranquio de cuerpo alargado y delgado que puede alcanzar los 75 cm en los machos y 90 en las hembras. La cabeza es aplanada y tiene el h...

Se trata de una especie bentónica que vive en fondos de arena, fango y grava entre 55 y 1200 m de profundidad. Tiene comportamiento nocturno. Se alime...

Desde las Islas Feroe y Noruega a Senegal y el Mediterráneo....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/galeus-melastomus.html>

Carex extensa Gooden.

Planta densamente cespitosa con un rizoma endeble. Las vainas de las hojas basales son de color pardo y enteras. Los tallos fértiles miden entre 15 y ...

Vive en aguas salobres de marismas costeras y también en zonas húmedas continentales de salinidad elevada. Aparece en el supraestero en suelos arenoso...

Costa europea y mediterránea....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/carex-extensa.html>

Bolboschoenus maritimus L.

Planta perenne rizomatosa, con tallos de 30 - 120 cm, trígono y escábridos en la parte superior. Las hojas son planas y están bien desarrolladas, midi...

Vive en suelos de mesohalinos a oligohalinos permanentemente húmedos, fangosos, en marismas subhalófilas, ya sea en los canales que drenan el agua del...

Toda la costa europea....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/bolboschoenus-maritimus.html>

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Aglais urticae (Linnaeus, 1758) (Arthropoda)

Boloria pales (Denis & Schiffermüller, 1775) (Arthropoda)



Frankenia laevis L. (Magnoliophyta)

Gonepteryx cleopatra (Linnaeus, 1767) (Arthropoda)

Gonepteryx rhamni (Linnaeus, 1758) (Arthropoda)

Lavatera cretica L. (Magnoliophyta)

Satyrium esculi (Arthropoda)

Spiranthes aestivalis (Poir.) Rich. (Magnoliophyta)

Thymus mastichina (L.) L. (Magnoliophyta)

Verbena officinalis L. (Magnoliophyta)

ISSN 1887-5068



9 771887 506008