



Num. 830. Publicado el 22/02/2021

La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.

Fotografía: *Amphiura chiajei*. Por Marcos Fernández Iglesias



Num. 830. Publicado el 22/02/2021

Descripciones de especies

Santolina rosmarinifolia L.

Subarbusto de 35-90 cm, no viscoso-glanduloso, de glabro a glabrescente, de un verde grisáceo o verde oscuro. Tallos vegetativos 6-16 cm, más o menos...

Claros de matorral, pedregales, suelos removidos, indiferente al substrato; 250-1900 m. ...

Principalmente, C y O de la Península Ibérica....

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/santolina-rosmarinifolia.html>

Limaria loscombi (G. B. Sowerby I, 1823)

Concha de hasta unos 20 mm de longitud, generalmente menor, de color blanco más o menos translúcida, fina, frágil, hinchada, de contorno similar a un ...

Gravas finas o arenas de 10 a 200 m de profundidad....

Atlántico norte y Mediterráneo....

Por FERNÁNDEZ IGLESIAS, Marcos

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/limaria-loscombi.html>

Eublemma purpurina (Denis & Schiffermüller, 1775)

Noctúido con una envergadura alar de 20 a 26 mm. De coloración general blanquecina-amarillenta, tiene el tercio basal de las alas anteriores de color ...

Pasa el invierno en forma de oruga. Las larvas se alimentan principalmente de *Cirsium*, *Carduus* y, según literatura, sobre *Echinops*. Se las encuentra s...

Se encuentra distribuida por toda Europa, Turquía y hasta el centro occidental de Asia. ...

Por GONZÁLEZ LÓPEZ, José Rafael

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/eublemma-purpurina.html>

Atrichum angustatum (Brid.) Bruch & Schimp.

Musgo dioico con un gametófito de unos 3 cm. Filidios de 4-5 mm, crispados en estado seco, erecto-patentes de lisos más o menos ondulados en estado hú...



Taludes y rellanos húmedos sobre suelo silíceo. Mesófila, esciófila, terrícola, probablemente calcífuga....

Subatlántica....

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/atrichum-angustatum.html>

Amphiura chiajei Forbes, 1843

Amphiura chiajei es una ofiura de discreto tamaño, en torno a 1 o 1,2 centímetros de diámetro de disco y con brazos de unos 8 centímetros de longitud....

Vive enterrada en fondos blandos a partir de unos 6 m. de profundidad....

Atlántico noreste y Mediterráneo....

Por FERNÁNDEZ IGLESIAS, Marcos

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/amphiura-chiajei.html>

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Amphiura chiajei Forbes, 1843 (Echinodermata)

Baeomyces rufus (Huds.) Rebent. (Ascomycota)

Eublemma purpurina (Denis & Schiffermüller, 1775) (Arthropoda)

ISSN 1887-5068

