



## Num. 838. Publicado el 19/04/2021

*La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.*

Fotografía: *Abra tenuis*. Por César Fernández González



**Num. 838. Publicado el 19/04/2021**

## Descripciones de especies

### *Veronica arvensis* L.

Hierba anual con tallos de 1-40 cm, de erectos a decumbentes, simples, o más frecuentemente, ramificados desde la base, con pelos glandulíferos de 0,3...

Ruderal, frecuente en zonas aclaradas o removidas de prados y pastos terofíticos, cunetas, taludes, bordes de cultivos, etc.; 0-2900 m. ...

Holártica que ha pasado a subcosmopolita; distribuida por la mayoría de las regiones templadas de ambos hemisferios; como introducida en Japón, S de A...

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/veronica-arvensis.html>

### *Pododesmus patelliformis* (Linnaeus, 1761)

Molusco bivalvo de concha de hasta 38.1 mm de diámetro, de color blancon, en ocasiones con marcas rojo parduscas, el interior de la valva superior bla...

Vive en sustratos duros y conchas muertas hasta una profundidad considerable....

Desde Noruega al Mediterráneo....

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/pododesmus-patelliformis.html>

### *Ononis striata* Gouan

Planta sufruticosa hasta de 20 cm, decumbente. Tallos ramificados y leñosos en la base, pubérulo-glandulosos, con pelos no glandulíferos de menos de 0...

Claros de matorral, roquedos, pedregales y grietas de rocas calcáreas; (550)900-2200(2300) m....

SO de Europa (Francia, Italia y España). N y CE de España. ...

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/ononis-striata.html>

### *Lactuca plumieri* (L.) Gren. & Godr.

Hierba perenne de 55-150 cm, glabra, generalmente unicaule, rizomatosa, inerme; rizoma de 0,9-1,6 cm de diámetro, corto, escamoso, de un pardo oscuro...

Herbazales megafórbicos, taludes, orillas de barrancos, claros de hayedo, más raramente en saucedas y alisedas, indiferente edáfico; (300)850-2200 m....



Centro y sur de Europa -eje pirenaico-cantábrico, Macizo Central francés, Alpes y Balcanes-; naturalizada en Inglaterra. N de la Península Ibérica, Pi...

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/lactuca-plumieri.html>

## *Anthemis maritima subsp. maritima* L.

Hierba perenne o subarbusto, a menudo rizomatosa, con raíces largas y filiformes, glabra o glabrescente, aromática. Cepa de 3-10 mm de diámetro; rizom...

Arenales y roquedos del litoral; 0-70 m....

Oeste y C de la Región Mediterránea. Costa SW y NE de la Península Ibérica e Islas Baleares, muy localizada en las costas ampurdanesa y valenciana....

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/anthemis-maritima-subsp-maritima.html>

## **Nuevas especies incluidas en asturnatura.com**

*Cyrellia linearis* (Montagu, 1803) (Mollusca)

*Helleborus viridis* L. ()

*Oenopia conglobata* (Linnaeus, 1758) (Arthropoda)

