



## Num. 84. Publicado el 17/07/2006

*La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.*

Fotografía: *Flammulina velutipes*. Por Enrique Rubio Domínguez



**Num. 84. Publicado el 17/07/2006**

## Descripciones de especies

### *Zeugopterus punctatus* (Bloch, 1787)

Pez plano de contorno oblongo que alcanza los 25 o 50 cm de longitud. La aleta dorsal (88 + 10 radios blandos), comienza muy próxima a la mandíbula do...

Vive en fondos de piedra o bloques en aguas no muy profundas y se alimenta de pequeños peces y crustáceos. Se reproduce entre marzo y junio....

Atlántico norte, desde Noruega al Cantábrico y también en el Atlántico oeste....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/zeugopterus-punctatus.html>

### *Senecio aquaticus* Hill

Hierba anual o más frecuentemente bianual, glabra, con tallos erectos que pueden alcanzar los 120 cm. Estos tallos tienen costillas que se ven teñidas...

Se trata de una especie que puede encontrarse en prados húmedos, orillas de ríos, rías, arroyos, cunetas húmedas en los bordes de los caminos, en zona...

Oeste y Centro de Europa....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/senecio-aquaticus.html>

### *Linaria supina subsp. maritima* (DC.) M. Laínz

Se trata de una planta bianual o perenne de base algo leñosa. Sus tallos, que miden hasta 30 cm de longitud, son decumbentes y luego se hacen ascenden...

Crece en sistemas dunares, especialmente en las dunas secundarias o grises, desde el nivel del mar a los 20 m de altitud....

Costa cantábrica oriental y francesa meridional....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/linaria-supina-subsp-maritima.html>

### *Limonium binervosum* (G.E. Sm.) C.E. Salmon

Planta perenne multicaule y más o menos glabra. Tiene una cepa de hasta 10 cm de la que surge una roseta de hojas basales; estas hojas, 10 - 80 x 5

- ...



Vive en costas rocosas, fisuras, grietas y rellanos de acantilados y también en saladares costeros y fangos salobres....

Presente en la costa atlántica europea desde Escocia al Cantábrico....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/limonium-binervosum.html>

## *Juncus gerardi* Loisel.

Planta perenne, más o menos cespitosa y rizomatosa, cuyos tallos, a veces comprimidos, alcanzan los 5 - 80 cm de altura; tienen entre 1 y 3 vainas bas...

Vive en las zonas superiores del supraestero o en suelos linoso-arenosos no muy salinos, principalmente en la marisma interna subhalófila. Se puede in...

Aparece en la mayor parte de Europa, Asia occidental y central, NO de África y el N de América....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/juncus-gerardi.html>

## *Halimione portulacoides* (L.) Aellen

Pequeño arbustillo de hasta 1.5 m de altura con base leñosa, glabro, lepidoto o farináceo. Los tallos, no articulados como en otras especies de la fam...

Vive en marismas, terrenos con suelos salinos encharcados del litoral aunque en raras ocasiones aparece en zonas interiores. Preferentemente aparece e...

Costa atlántica y mediterránea europea. También en la costa E de Norteamérica y el S de África. Escasa en el Cantábrico....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/halimione-portulacoides.html>

## *Frankenia laevis* L.

Planta perenne, con base leñosa y tallos de hasta 50 m decumbentes y bastante ramificados, siendo las ramas secundarias bastante largas y arqueadas; s...

Suelos arenosos litorales y limos de marismas, hasta los 20 m de altitud....

Costa atlántica de Europa, más rara en la zona mediterránea e interiores...

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/frankenialaevis.html>

## *Elymus farctus* subsp. *boreali-atlanticus*



Planta provista de largos rizomas de los que surgen tallos rígidos de entre 20 y 60 cm de longitud bastante frágiles. Las hojas, de 2 a 6 mm de ancho, ...

Se trata de una gramínea propia de plantas y dunas, al igual que el barrón, *Ammophila arenaria* subsp. *australis*...

Aparece en costas del Norte y Noroeste europeo....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/elymus-farctus-subsp-boreali-atlanticus.html>

## *Beta maritima* L.

Planta anual o perenne, postrada o erecta, con escasa pilosidad o carente de ella. Sus tallos miden entre 20 y 80 cm y están provistos de hojas altern...

Vive en arenales costeros aunque también puede aparecer, raramente, en cubetas endorreicas del interior....

De amplia distribución mundial, en Europa aparece en el O y S y en España en casi todas las provincias costeras....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/beta-maritima.html>

## *Asperula cynanchica* subsp. *occidentalis*

Planta laxamente cespitosa provista de estolones reptantes de color anaranjado u ocre. Tiene tallos de entre 3 y 16 cm, procumbentes - ascendentes, he...

Vive en dunas y arenales costeros hasta los 40 m de altitud....

Norte de la Península Ibérica, SO de Francia, SO de las Islas Británicas e Irlanda....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/asperula-cynanchica-subsp-occidentalis.html>

## **Nuevas especies incluidas en asturnatura.com**

*Argiope bruennichi* (Scopoli, 1772) (Arthropoda)

*Asperula cynanchica* L. (Magnoliophyta)

*Asperula cynanchica* subsp. *occidentalis* (Rouy) Stace (Magnoliophyta)

*Asperula occidentalis* Rouy (Magnoliophyta)



*Chenopodium bonus-henricus* L. (Magnoliophyta)

*Davallia canariensis* L. Sm. (Pteridophyta)

*Dianthus hyssopifolius* L. (Magnoliophyta)

*Erebia gorge* (Hübner, 1805) (Arthropoda)

*Erinaceus europaeus* Linnaeus, 1758 (Chordata)

*Galeopsis tetrahit* L. (Magnoliophyta)

*Juncus gerardi* (Magnoliophyta)

*Lobelia urens* L. (Magnoliophyta)

*Ononis spinosa subsp. spinosa* L. (Magnoliophyta)

*Senecio aquaticus* Hill (Magnoliophyta)

*Zeugopterus punctatus* (Bloch, 1787) (Chordata)

ISSN 1887-5068

