



Num. 840. Publicado el 03/05/2021

La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.

Fotografía: *Silene gallica*. Por Ignacio Fernández Villar



Num. 840. Publicado el 03/05/2021

Descripciones de especies

Santolina benthamiana Jord. & Fourr.

Subarbusto de 20-65 cm, no viscoso-glanduloso, laxamente tomentoso, aromático. Tallos vegetativos 5-16 cm, más o menos erectos, con fascículos formado...

Pedregales, roquedos y claros de matorral, por lo general en substratos calizos, en ocasiones sobre esquistos; (600)1500-2000 m....

Pirineos centrales y orientales y macizos montañosos cercanos....

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/santolina-benthamiana.html>

Polycarpon tetraphyllum subsp. diphyllum (Cav.) O. Bolòs & Font Quer

Planta herbácea anual, glabra, habitualmente manchada de púrpura, al menos en la base, con tallos de 6-8(10) cm, de postrados a ascendentes, simples o...

Preferentemente en arenales costeros; 0-50(550) m....

Región mediterránea. Zonas costeras de la Península Ibérica e Ibiza....

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/polycarpon-tetraphyllum-subsp-diphyllum.html>

Peltigera canina (L.) Willd.

Liquen de talo foliáceo lobulado, grande y que puede llegar a cubrir grandes extensiones. de hasta 30 o más cm de diámetro; lóbulos de hasta 3 cm de a...

Especie común, tanto en substratos ácidos como básicos; sobre briófitos saxícolas o terrícolas, en superficies horizontales o taludes....

En ambos hemisferios; circumpolar en el hemisferio norte y rara en el hemisferio sur....

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/peltigera-canina.html>

Ceramium ciliatum (J. Ellis) Ducluzeau

Alga roja cuyo talo es de densamente almohadillo a escasamente ramificado, de 2.5-7(15) cm de altura, formado por ejes entremezclados prostrados que d...

Sobre rocas o epífita en otras algas, en ocasiones sobre lapas, en el intermareal medio o inferior y submarel hasta los 10 m de profundidad, a menudo ...

De Noruega a Canarias y Cabo Verde....



Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/ceramium-ciliatum.html>

Abra tenuis (Montagu, 1803)

Molusco bivalvo de concha fina y frágil, subtriangular, de hasta 13 mm de longitud de color blanco sucio, con periostraco gris pálido y superficie int...

Vive enterrada en fondos blandos, estuarios, en zonas de salinidad variable, en el intermareal únicamente....

Aparece desde el Mar del Norte al Mediterráneo y el NO de África....

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/abra-tenuis.html>

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Armeria maritima Willd. (Magnoliophyta)

Caulacanthus ustulatus (Mertens ex Turner) Kützing (Rhodophyta)

Plagiotrochus quercusilicis (Fabricius, 1798) (Arthropoda)

