



Num. 847. Publicado el 21/06/2021

La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.

Fotografía: *Eubranchus prietoi*. Por Marcos Fernández Iglesias



Num. 847. Publicado el 21/06/2021

Descripciones de especies

Valerianella locusta (L.) Laterr.

Hierba anual con tallos de 1-30(40) cm, ramificados en la mitad superior o desde la base, con 1-4 dicotomías, rara vez simples, glabros, retrorso-esca...

En herbazales subnitrofilos de lugares sombreados y algo húmedos, ruderal y arvense; 0-1700 m....

Macaronesia (Madeira y Canarias), Europa –excepto el N–, N de África y SW de Asia. Dispersa por toda la Península....

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/valerianella-locusta.html>

Periphyllus testudinaceus (Ferne, 1852)

Áfido cuyas hembras ápteras tienen una longitud corporal de 2,0 a 3,7 mm, con una coloración verde oscuro sucio a marrón oscuro o negruzco y presentan...

Especie polífaga que parasita varias especies de arce, incluido el arce común (*Acer campestre*), el arce noruego (*Acer platanoides*) y el sicomoro (*Acer...*

Periphyllus testudinaceus se encuentra en toda Europa y ha sido introducido en otras partes del mundo, incluidas Nueva Zelanda y América del Norte....

Por GONZÁLEZ LÓPEZ, José Rafael

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/periphyllus-testudinaceus.html>

Myrmilla calva (Villers, 1789)

Mutílido con una longitud corporal de 4 a 10 milímetros (hembra) o de 5 a 9 milímetros (macho). Hembras ápteras, con la cabeza negra mostrando en su p...

Amante de biotopos cálidos, secos, en los que habitan sus hospedadores; los imagos vuelan desde abril hasta octubre y sus larvas son parasitoides de a...

Se encuentra distribuida por Europa y países africanos mediterráneos. Es una de las tres especies de este género presentes en la península Ibérica....

Por GONZÁLEZ LÓPEZ, José Rafael

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/myrmilla-calva.html>

Geomyza tripunctata Fallén, 1823

Pequeño díptero con una longitud corporal de 3 a 4 mm, de aspecto esbelto. Mesonoto de color bronce presentando dos filas de fuertes cerdas. Ojos



comp...

Los imagos se ven volando de abril a septiembre. Su hábitat son los bordes de bosques y praderas. Se pueden observar desplazándose por las hojas de l...

La especie está ampliamente distribuida en Europa. Su presencia llega hasta el sur de África del Norte y al este hasta el Medio Oriente. Se ha citado ...

Por GONZÁLEZ LÓPEZ, José Rafael

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/geomyza-tripunctata.html>

Calendula suffruticosa subsp. tomentosa (Desf. ex Ball) Murb.

Hierba perenne, leñosa en la base con tallos de (21)31,8-75(111) cm, prostrados o difusos, más o menos ramificados, densamente blanco-araneosos, no vi...

Arenales y terrenos margosos cercanos al mar; 0-100 m....

Endemismo de la provincia de Cádiz, desde Punta Camarinal a Tarifa....

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/calendula-suffruticosa-subsp-tomentosa.html>

Novedades corológicas

Eubbranchus prietoi Llera & Ortea, 1981 (Mollusca)

Primera cita para Galicia. - Citado por Marcos Fernández Iglesias en HIO (RESTO PARROQUIA), Al sur de Cabo Pequeño. Entre la Playa de Barra y Punta Subrido (zona noroeste de la Ría de Vigo), Cangas. Po el día 17/06/2021

Más información en <http://www.asturnatura.com/fotografia/fauna-invertebrados/eubbranchus-prietoi-1/36743.html>

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Corallina caespitosa R.H. Walker, J. Brodie et L.M. Irvine (Rhodophyta)

Eubbranchus prietoi Llera & Ortea, 1981 (Mollusca)

Geomyza tripunctata Fallén, 1823 (Arthropoda)

Myrmilla calva (Villers, 1789) (Arthropoda)

