



Num. 85. Publicado el 24/07/2006

La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.

Fotografía: *Claussenomyces prasinulus*. Por Enrique Rubio Domínguez



Num. 85. Publicado el 24/07/2006

Descripciones de especies

Samolus valerandi L.

Planta perenne, herbácea, tierna, de color verde mate. Raíces de hasta 6 cm, fibrosas, fasciculadas. Tallo de (2)5-50(70) cm, folioso, más o menos fist...

Rezumaderos, carrizales, juncales, cunetas húmedas, orillas de agua corriente o estancada y en general en suelos encharcados temporalmente; 0-1150 m....

Subcosmopolita: Asia, región mediterránea, C y O de Europa, Macaronesia; introducida en América. Península Ibérica y Baleares; no se ha citado de Ando...

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/samolus-valerandi.html>

Rhynchospora alba (L.) Vahl

Planta perenne provista de un corto rizoma. Tallos de 10 - 40 cm, cilíndricos o trígonos y algo cespitosos. Hojas basales 10 - 15 x 1 - 2 mm, las caul...

Vive en esfagnales, brezales higroturbosos, manantiales y turberas en zonas ácidas con influencia atlántica hasta los 1200 m. Pertenece principalmente...

Mayor parte de Europa, excepto en el SE y zona mediterránea....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/rhynchospora-alba.html>

Pinguicula lusitanica L.

Planta carnívora perenne que pasa el invierno manteniendo una roseta de hojas basales. Estas hojas son enteras, carnosas, oblongo - ovadas, verde - gr...

Vive en turberas y manantiales hasta los 250 m de altitud....

Oeste de Europa (hasta los 5° E en Francia aproximadamente) y NW de África....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/pinguicula-lusitanica.html>

Narthecium ossifragum (L.) Huds.



Planta herbácea, rizomatosa y perenne, con un tallo de entre 5 y 45 cm. Las hojas son opuestas, dísticas, ensiformes, miden 3 - 20 cm de longitud y tie...

Se encuentra en tuberías y zonas higróturbosas en sustratos ácidos hasta los 1600 m de altitud. ...

Oeste y Norte de Europa, alcanzando su límite sur el Norte de Portugal....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/narthecium-ossifragum.html>

Erica mackaiana Bab. in J. Mackay

Arbusto de 0,10-0,60(0,90) m, con tallos jóvenes de costillas inapreciables, angulosos, pardos, con indumento denso, patente, de pelos no glandulífero...

Brezales, matorrales y bosques aclarados, en suelos permanentemente húmedos, incluso en los calizos y ultrabásicos, en la costa o cerca de ella; 0-100...

Irlanda y Península Ibérica. N de España, desde Galicia hasta Cantabria....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/erica-mackaiana.html>

Drosera rotundifolia L.

Planta perenne, insectívora, bastante fácil de reconocer y bastante llamativa por su forma de vida. Es una planta pequeña, solitaria, con todas las ho...

Generalmente vive sobre musgos del género *Sphagnum*, en zonas turbosas, manantiales en terreno silíceo entre los 50 y 1300 m. ...

Presente en toda Europa excepto en algunas islas y el extremo sur....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/drosera-rotundifolia.html>

Cochlearia aestuaria (J. Lloyd) Heywood

Hierba perenne provista de varios tallos erectos que alcanzan los 25 - 45 cm durante la floración. Las hojas son enteras, las basales de 2 - 5 x 1.5 - ...

Vive en suelos limosos y muy húmedos que son encharcados por aguas poco salobres, común en bordes de canales de drenaje que surcan la marisma donde la...

Presente sólo en el oeste de Francia y costa cantábrica española....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/cochlearia-aestuaria.html>



Arnica montana subsp. atlantica L.

Planta herbácea perenne y rizomatosa. Tiene tallos de entre 25 y 60 cm de altura, con hojas simples, generalmente todas basales aunque puede haber alg...

En brezales y herbazales de laderas umbrosas hasta los 1700 m. ...

Desde Noruega al sur de Portugal....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/arnica-montana-subsp-atlantica.html>

Anagallis tenella (L.) L.

Planta perenne, herbácea, con tallo procumbente, cuadrángular y subalado, que enraíza en los nudos y que puede alcanzar los 25 cm. Las hojas son entera...

Vive en zonas húmedas, arroyos, turberas y zonas encharcadas temporalmente sobre sustratos silíceos con influencia atlántica, hasta los 1500 m de altu...

Presente en la mitad oeste de Europa y en la Península ampliamente distribuida....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/anagallis-tenella.html>

Achillea millefolium L.

Hierba perenne con un rizoma de (1,3)1,5-5(7) mm de diámetro, de horizontal a oblicuo, más o menos ramificado, con tallos floríferos y estolones subte...

Pastizales, prados, taludes, bosques claros y lugares abiertos en general; 10-2300(2700) m....

Europa y Asia septentrional; naturalizada esporádicamente en las zonas templadas y frías de otros continentes. Áreas extramediterráneas de la mitad no...

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/achillea-millefolium.html>

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Campanula arvatika subsp. arvatika Lag. (Magnoliophyta)

Cochlearia aestuaria (J. Lloyd) Heywood (Magnoliophyta)



Cochlearia danica L. (Magnoliophyta)

Cochlearia pyrenaica DC. (Magnoliophyta)

Drosera intermedia Hayne (Magnoliophyta)

Lemna minor L. (Magnoliophyta)

Mentha longifolia (L.) Huds. (Magnoliophyta)

Scabiosa columbaria L. (Magnoliophyta)

