



Num. 864. Publicado el 18/10/2021

La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.

Fotografía: *Castanea sativa*. Por Juan Luis Menéndez



Num. 864. Publicado el 18/10/2021

Descripciones de especies

Trifolium rubens L.

Hierba perenne, estolonífera, glabra, salvo los pecíolos, pedúnculos y pedicelos, que pueden ser glabrescentes. Tallos 1-60 cm, enraizantes en los nud...

Prados de siega, bordes de arroyos, fuentes, etc.; 0-2400 m....

Europa -por debajo de 70° N- y regiones mediterránea y macaronésica (Azores, Madeira y Canarias). Ampliamente cultivada para formar céspedes en jardín...

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/trifolium-rubens.html>

Sorbus torminalis (L.) Crantz

Árbol de hasta 20 m. Ramas jóvenes pelosas, con lenticelas abundantes; corteza escamosa, gris; yemas 5-9 mm, obovoides, obtusas, con 5-7 escamas cilia...

Robledales, quejigares, encinares y pinares -muchas veces en los claros y en los márgenes-, matorrales, etc.; en todo tipo de substratos; 0-1400 m....

Oeste, C y S de Europa, el Cáucaso, NO de África, Anatolia y N de Siria. Casi toda la Península Ibérica -salvo en la mayoría de las provincias del cua...

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/sorbus-torminalis.html>

Rocella phycopsis Ach.

Liquen de talo fruticuloso, de 2 a 7 cm de longitud, que puede formar almohadillas densas. Ramas cilíndricas, de 0,5-1,5 mm de diámetro que en algunos...

Sobre rocas verticales no soleadas próximas al mar no soleadas, preferentemente calcáreas, en la comunidad de *Dirina massiliensis* y *Lecanographa grumu...*

Liquen mediterráneo, que se extiende por la costa atlántica hasta el sur de Inglaterra....

Por GONZÁLEZ LÓPEZ, José Rafael

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/roccella-phycopsis.html>

Dasylabris atrata (Linnaeus, 1767)

Mutílido cuyos machos tienen una longitud 10-15 mm, y las hembras miden de 7-13 mm. Recubiertos con una pilosidad larga y erizada. Coloración general ...



Habitán zonas cálidas y arenosas y los imagos se pueden observar de julio a septiembre. Sus larvas se desarrollan en los nidos de avispas zapadoras.

...

Especie de distribución mediterránea....

Por GONZÁLEZ LÓPEZ, José Rafael

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/dasylabris-atrata.html>

Centaurea langei Nyman

Hierba perenne, con raíz axonomorfa, sufruticulosa, multicaule, inerme -excepto débilmente las brácteas involucrales-, más o menos verde, de un verde ...

Claros y orlas de bosque, matorrales, herbazales de borde de camino, en suelos ácidos o básicos más o menos nitrificados; 100-1800 m....

Endemismo del NO, CO y CN de la Península Ibérica....

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/centaurea-langei.html>

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Agaricus amethystinus Huds. (Basidiomycota)

Agaricus lividopurpureus With. (Basidiomycota)

Akis genei Solier, 1836 (Arthropoda)

Akis ilonka (Strassen, 1957) (Arthropoda)

Alauda petrosa Montagu, 1798 (Chordata)

Anthus petrosus (Montagu, 1798) (Chordata)

Cervus dama Linnaeus, 1758 (Chordata)

Chrysoteuchia culmella (Linnaeus, 1758) (Arthropoda)

Clitocybe amethystina (Cooke) Peck (Basidiomycota)

Collybia amethystina (Cooke) Quél. (Basidiomycota)



- Cytisus tridentatus* var. *lasianthus* (Spach) Briq. (Magnoliophyta)
- Dasylabris atrata* (Linnaeus, 1767) (Arthropoda)
- Euphrasia arvetii* Sennen (Magnoliophyta)
- Euphrasia cabreræ* Sennen & Gonzalo (Magnoliophyta)
- Euphrasia nemorosa* subsp. *pectinata* (Ten.) Malag. & Barrau (Magnoliophyta)
- Euphrasia pectinata* Ten. (Magnoliophyta)
- Euphrasia stricta* subsp. *pectinata* (Ten.) P. Fourn. (Magnoliophyta)
- Evernia tinctoria* (DC.) Roum. (Ascomycota)
- Genista cantabrica* Spach (Magnoliophyta)
- Genista lasiantha* Spach (Magnoliophyta)
- Genista scolopendria* Spach (Magnoliophyta)
- Genista undulata* Link (Magnoliophyta)
- Genistella lasiantha* (Spach) Holub (Magnoliophyta)
- Genistella tridentata* subsp. *lasiantha* (Spach) Holub (Magnoliophyta)
- Laccaria hudsonii* var. *vinosostriata* (Ballero & Contu) Pázmány (Basidiomycota)
- Laccaria laccata* var. *amethystina* (Cooke) Rea (Basidiomycota)
- Lecanora tinctoria* (DC.) Czerwiak. (Ascomycota)
- Lichen fucoides* Neck. (Ascomycota)
- Lichen phycopsis* (Ach.) Ach. (Ascomycota)
- Lichen roccella* L. (Ascomycota)
- Maja crispata* Risso, 1827 (Arthropoda)



Mutilla atrata Linnaeus, 1767 (Arthropoda)

Nemaria fucoides (Neck.) Navàs (Ascomycota)

Nemaria roccella (L.) Navàs (Ascomycota)

Parmelia roccella (L.) Ach. (Ascomycota)

Phillyrea buxifolia (Aiton) Link (Magnoliophyta)

Phillyrea castellana-media Sennen (Magnoliophyta)

Phillyrea foliosa Sennen (Magnoliophyta)

Phillyrea latifolia subsp. rodriguezii (P. Monts.) Romo (Magnoliophyta)

Phillyrea ligustrifolia L. (Magnoliophyta)

Phillyrea nerifolia-media Sennen (Magnoliophyta)

Phillyrea oleaefolia Mill. (Magnoliophyta)

Phillyrea spinosa Mill. (Magnoliophyta)

Phillyrea stricta Bertol. (Magnoliophyta)

Phillyrea virgata (Aiton) Willd. (Magnoliophyta)

Pterospartum lasianthum (Spach) Willk. (Magnoliophyta)

Pterospartum tridentatum (L.) Willk. (Magnoliophyta)

Pterospartum tridentatum subsp. lasianthum (Spach) Talavera & P.E. Gibbs (Magnoliophyta)

Pterospartum tridentatum subsp. tridentatum (L.) Willk. (Magnoliophyta)

Rhinanthus burnatii (Chabert) Soó (Magnoliophyta)

Roccella fucoides (Neck.) Vain. (Ascomycota)

Roccella tinctoria DC. (Ascomycota)



Russulopsis laccata var. *amethystina* (Cooke) J. Schröt. (Basidiomycota)

Stereocaulon roccella (L.) Raeusch. (Ascomycota)

Thamnium roccella (L.) A. St.-Hil. (Ascomycota)

Tinea culmella Linnaeus, 1758 (Arthropoda)

