



Num. 95. Publicado el 02/10/2006

La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.

Fotografía: *Inachis io*. Por José Luis Porto Torres



Num. 95. Publicado el 02/10/2006

Descripciones de especies

Trametes versicolor (L.) Pil.

Hongo que desarrolla cuerpos fructíferos o setas (basidiomas) con sombreros imbricados, de 3 a 6 cm, delgados, de borde ondulado, que carecen de pie y...

Especie abundante que vive sobre madera muerta, generalmente de árboles caducifolios, y es normal que varios ejemplares crezcan juntos de forma imbric...

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/trametes-versicolor.html>

Scleroderma citrinum Pers.

Hongo que tiene la parte fértil o himenio en el interior de una estructura más o menos subterránea, de 3 - 10 cm, globosa, coriácea, de color beis a a...

Aparece en bosques de planifolios, especialmente bajo robles, y en brezales húmedos con presencia de musgos....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/scleroderma-citrinum.html>

Panaeolus semiovatus (Sow.) Wünsche

Hongo que desarrolla cuerpos fructíferos o setas (basidiomas) con sombrero de 5 - 8 x 3 - 5 cm, más o menos ovoide - campanulado, con forma de medio h...

Aparece sobre excrementos de bovino....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/panaeolus-semiovatus.html>

Hypholoma fasciculare (Huds.) Kumm

Hongo que forma setas (basidiomas) con sombrero de 4 - 8 cm, globoso al principio y luego más o menos aplanado, de color amarillo vivo con el centro p...

Especie abundante que forma céspedes compactos sobre tocones, raíces y troncos caídos de caducifolios y coníferas. Aparece en otoño y primavera....

Por asturnatura.com



Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/hypholoma-fasciculare.html>

Fistulina hepatica (Sch.) Fr.

Hongo que al principio aparece como un bulto en el árbol donde crece, pero luego se transforma en una masa con forma de riñón o abanico, de 10 a 25 cm...

Vive parasitando robles (*Quercus robur*, *Quercus* sp.) y castaños (*Castanea sativa*) y es posible contemplar su sombrero en verano y otoño....

Por [asturnatura.com](http://www.asturnatura.com)

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/fistulina-hepatica.html>

Cortinarius violaceus (L.) Fr.

Hongo que desarrolla cuerpos fructíferos o setas (basidiomas) provistas de un sombrero de 10 - 15 cm, de un llamativo color violeta oscuro que se hace...

Aparece en zonas húmedas de bosques de planifolios, como en orillas de ríos, y menos en pinares....

No es muy abundante....

Por [asturnatura.com](http://www.asturnatura.com)

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/cortinarius-violaceus.html>

Boletus edulis Bull.

Macroscopía. cuerpos fructíferos o setas (basidiomas) robustos, con sombrero de 12 a 25 cm de diámetro, hemisférico, convexo, con superficie de color...

Relativamente abundante, vive en bosques de robles, hayas, de coníferas en zonas altas, en suelos preferentemente ácidos, y en sus claros, frecuentemente...

Aparece desde África del norte hasta Grecia y Finlandia....

Por [asturnatura.com](http://www.asturnatura.com)

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/boletus-edulis.html>

Amanita spissa (Fr.) Kumm

Hongo que desarrolla cuerpos fructíferos (basidiomas) o setas (basidiomas) con sombrero de 10 - 18 cm, primero globoso y luego convexo extendido, algo...

Aparece de finales de verano a otoño en bosques de caducifolios. No es común....

Por [asturnatura.com](http://www.asturnatura.com)

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/amanita-spissa.html>



Amanita rubescens Pers.

Hongo que desarrolla cuerpos fructíferos (setas o basidiomas), que primero son globosos y luego convexo y plano, de 5 - 15 cm de diámetro, con cutícul...

Vive principalmente en bosques de coníferas pero también en robledales, hayedos, etc....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/amanita-rubescens.html>

Amanita citrina (Schaeff.) Pers.

Hongo que desarrolla cuerpos fructíferos o setas (basidiomas) con sombrero de 6 a 10 cm de diámetro, que es al principio hemisférico pero que se hace...

Vive en bosques de diferentes tipos, robledales, hayedos, etc....

Puede confundirse con *Amanita phalloides*...

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/amanita-citrina.html>

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Alisma plantago-aquatica L. (Magnoliophyta)

Aster lanceolatus (Magnoliophyta)

Ceratophyllum demersum L. (Magnoliophyta)

Chara vulgaris Linnaeus, 1753 (Charophyta)

Corylus avellana L. (Magnoliophyta)

Cryptogramma crista (L.) R. Br. ex Hook. (Pteridophyta)

Erigeron karvinskianus DC. (Magnoliophyta)

Humulus lupulus L. (Magnoliophyta)

Olea europaea var. *sylvestris* Brot. (Magnoliophyta)

ISSN 1887-5068



Sambucus nigra L. (Magnoliophyta)

Verbena bonariensis (Magnoliophyta)

